

کلامیدیا، باکتری بیماری زای خاموش



کرده و سرایت می‌کند. اندام مشبک شده فضایی بزرگ را بین سلول‌ها شکل می‌دهد و شروع به سازماندهی مجدد اندام‌های اولیه کوچک می‌کند.

تراکوماتیس می‌تواند هجده سرووار (کشش متداول سرولوژی) براساس سنجش آنتی‌بادی‌های مونولکونال (پادتن تک دودمانی) A, B, C مبتنی است، مشتق شود که از این سرووارها، سرووارهای Ba, C چشم شود، شده همچنین سرووارهای L1 – L3 نیز می‌توانند باعث لغوگرانولوم و نروم و سرووارهای K-D موجب عفونت‌های مجاری تناسلی شود، اشاره کرد.

مکانیسم ابتدایی این عفونت به صورت نفوذی نوتوروفیلی به سلول‌های مخاطی است که توسط لنفوسيتها، ماکروفائز، سلول‌های پلاس و اوزینوفیلیک مورد تهاجم قرار می‌گیرند.

این عفونت مقاربی اخیرا در مناطق گرم‌سیری به دلیل شیوع Outbreak پروکتیت زخمی که از هم جنس بازان مرد در چندین کشور آمریکایی و اروپایی پیدا شده و این بیماری بدون درمان، و دارای پیچیدگی‌های مزمن است.

اما اشکال اینجاست که اگر در مایع منی (نطفه) و ترشح پروسات نشانه‌ای از التهاب وجود داشته باشد عموماً نمونه‌های بررسی شده توسط روش‌های کشت رایج، یافت نمی‌شود.

Mardla و همکاران مشاهده کردند که مردان با پروسات مزمن آنتی‌بادی ضد تراکوماتیس دارند، درمانی وجود دارد که تنها ۳٪ مورد قابل کنترل است.

Short lifte و همکارانش نیز دریافتند که از هر ۲۰ نفر بیمار با التهاب غیر باکتریایی پروسات، آنتی‌بادی ضد کلامیدیا در مایع پروسات دارند.

از کلامیدیاها یکی که می‌تواند باعث عفونت در انسان‌ها شود کلامیدیا تراکوماتیس است که باعث عفونت مجاری پیشابی (ادراری) تحتانی در زنان و مردان می‌شود. این عفونت به صورت متداول در بین انسان‌ها رایج بوده اما این موضوع برای زنان باردار که در آن‌ها باعث ناباروری می‌شود یک مشکل جدی است. از جمله بیماری‌های به وجود آورنده این باکتری می‌توان به افزایش تورم مجاری ادراری، التهاب دردناک اپیدیدیم، تورم بیضه‌ها (ارکتیس)، التهاب مزمن پروسات و ناباروری اشاره کرد.

میکروب شناسی

کلامیدیا باکتری‌های گرم منفی و درون سلولی اجباری است که ترجیحاً به سلول‌های مخاطی سنگفرشی استوانه‌ای سرایت می‌کنند. از انواعی که می‌توان برای عفونت در بدن نام برد، شامل : پیونوئی، S-پیستاسی، S – تراکوماتیس است که از این سه گونه، S – تراکوماتیس مسؤول بیماری‌های منتقله از طریق ارتباط جنسی (STD) است.

شناسایی تراکوماتیس در سال ۱۹۰۷ به عنوان اولین عامل کلامیدیا انجام شد. چرخه‌ی زندگی تراکوماتیس به دو صورت برون سلولی (جسم اولیه) و درون سلولی (جسم مشبک) است. اندام اولیه که متصل به سلول‌های اپی تلیال استوانه‌ای است و به آن‌ها نفوذ می‌کند جایی است که به جسم مشبک تغییر شکل می‌یابد که شکل تناسلی در ارگانیسم است، انتقال پیدا

تشخیص

برای کشف این باکتری لازم به کشت و تست‌های هیبریدسازی و تست‌های تقویت کننده اسیدنوکلئیک (NAAIS) است که توسط نمونه آزمایش ادراری است. از راه‌های دیگر نیز می‌توان به آزمایشات بدون میکروبی مانند سنجش ایمنی آنزیم (EIA) و آزمایش کاوش NAAT اشاره کرد که نسبت به DNA کارآیی پایین‌تری دارد.

برای غربالگری زنان، سوآب واژینال نمونه ترجیحی است زیرا نسبت به نمونه‌های ادراری کارآیی بهتری دارد.

درمان

راهبرد درمانی عفونت کلامیدیایی تناسلی عارضه دار نشده در بالغین شامل موارد زیر است :

- درمان (جهت کاهش عوارض و پیشگیری در اتصال به دیگر شریکان جنسی بیمار است)
- درمان شریک جنسی (جهت جلوگیری از عفونت بیمار شاخص و عفونت دیگر شریکان)
- مشاوره جهت کاهش خطر
- تکرار تست کلامیدیا بی در زنان

نتیجه گیری

نقش کلامیدیایی تراکوماتیس برای ایجاد بیماری‌های اورولوژیک مردان مانند یورتریت، اپیدیدیمیت و اورکتیت به صورت گسترده‌ای مورد قبول است. همچنین می‌تواند باعث التهاب مزمن پروستات و دستگاه تناسلی و در پی پیشرفت، نازایی را به همراه داشته باشد. بهترین نمونه NAAT، نمونه ادراری در مردان و سوآب واژینال در زنان است. آزمایش بالینی برای تعیین کارآیی و تحمل آزتروومایسین و داکسی سایکلین در اولین مرحله درمان توصیه می‌شود.

همه گیر شناسی


کلامیدیا متداول‌ترین باکتری عفونی منتقله از طریق جنسی در جهان است که حدوداً باعث ایجاد هشتاد و نه میلیون مورد جدید عفونت در هر سال شده است که طبق آمار سازمان منع و کنترل بیماری (CDC) نسبت شیوع این بیماری در مردان و زنان نسبت ۳ به ۱ بوده است و شیوع این بیماری در افراد بین ۲۴ تا ۱۶ سال بیشتر است.

کلامیدیا به عنوان بیماری زای خاموش شناخته می‌شود به دلیل این که حدود ۳/۴ آلدگی زنان و نیمی از آلدگی در مردان بدون علائم است.

علائم بیماری

علائم کلامیدیا در صورت نمایان بودن آن شامل ترشح مواد چرکی - مخاطی، ادرار همراه با سوزش، خارش پیشاب و محل تخلیه ادرار، تکرر ادرار، افتادگی شکم یا درد لگن خاصره است که از ۱ تا ۲ هفته بعد از ابتلا می‌توان مشاهده کرد.

در بدترین حالت عفونت، کلامیدیا بدون درمان می‌توان مشکلاتی چون اپیدیدیمیت یا ارکیت را ایجاد کند و این هم در صورت انتقال عفونت به بیضه‌ها است و گاهی باعث عقیم شدن می‌شود. مطالعات بسیاری در رابطه با عفونت تراکوماتیس و کیفیت اسپرم صورت گرفته که همگی نتایج متضادی داشتند و این تحقیقات نشان داده است که مردان آلدگی به تراکوماتیس انزال‌های ضعیف تری نسبت به مردان غیر مبتلا دارند. همچنین اگر عفونت به صورت مزمن ادامه یابد می‌تواند در منطقه‌ی دفع مجرأ زیان بار باشد و یا حتی بر ساختار اسپرم تاثیر بگذارد.



[4] Low N, Mc carthy A , Macleod J , Salisburyc , Campell R , Roberts TE , et al. Epidemiological , social , diagnostic and economic evaluation of popwlation screening for gentical chlamy dial infection Health Technol Assess ; 11 ; 2007 :

[5] Miller WC , Ford CA , Morris M , Hand cock MS , Schmitz JL , Hobbs MM , et al. Prevalence of chlamydial and gonococcal infections among Young adults in the United States. JAMA , , 2004 2236 – 2229 : 291

[6] Van Bergen J , Gotz HM , Richardus JH , Hoebe CJ , Broer J , Coenen AJ, et al.Prevalence of urogenital Chlamydia trachomatis increases significantly with level of urbanization and suggests targeted screening approaches : results from the first national population based study in the Netherlands. Sex Transm Infect.2005

منابع

- [1] Halberstädter L , Von Prowazek
S Über Zellinschlusse para sitarer Natur
beim Trachom , Arb Gesundh (Berlin)
47 - 44 : 26 ; 1907

- [2] World Health Organization. Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted infections Over view and estimates. Geneva : World Health Organization ; 2001

- [3] Centers for Disease Control and Prevention Sexually transmitted disease Surveillance 2009. Atlanta : Centers for